

TABELA DE AUXÍLIO NA PREVISÃO DE PARTO


DC	PP	DC	PP	DC	PP	DC	PP	DC	PP	DC	PP
1/1	9/10	1/2	9/11	1/3	8/12	1/4	8/1	1/5	7/2	1/6	10/3
2/1	10/10	2/2	10/11	2/3	9/12	2/4	9/1	2/5	8/2	2/6	11/3
3/1	11/10	3/2	11/11	3/3	10/12	3/4	10/1	3/5	9/2	3/6	12/3
4/1	12/10	4/2	12/11	4/3	11/12	4/4	11/1	4/5	10/2	4/6	13/3
5/1	13/10	5/2	13/11	5/3	12/12	5/4	12/1	5/5	11/2	5/6	14/3
6/1	14/10	6/2	14/11	6/3	13/12	6/4	13/1	6/5	12/2	6/6	15/3
7/1	15/10	7/2	15/11	7/3	14/12	7/4	14/1	7/5	13/2	7/6	16/3
8/1	16/10	8/2	16/11	8/3	15/12	8/4	15/1	8/5	14/2	8/6	17/3
9/1	17/10	9/2	17/11	9/3	16/12	9/4	16/1	9/5	15/2	9/6	18/3
10/1	18/10	10/2	18/11	10/3	17/12	10/4	17/1	10/5	16/2	10/6	19/3
11/1	19/10	11/2	19/11	11/3	18/12	11/4	18/1	11/5	17/2	11/6	20/3
12/1	20/10	12/2	20/11	12/3	19/12	12/4	19/1	12/5	18/2	12/6	21/3
13/1	21/10	13/2	21/11	13/3	20/12	13/4	20/1	13/5	19/2	13/6	22/3
14/1	22/10	14/2	22/11	14/3	21/12	14/4	21/1	14/5	20/2	14/6	23/3
15/1	23/10	15/2	23/11	15/3	22/12	15/4	22/1	15/5	21/2	15/6	24/3
16/1	24/10	16/2	24/11	16/3	23/12	16/4	23/1	16/5	22/2	16/6	25/3
17/1	25/10	17/2	25/11	17/3	24/12	17/4	24/1	17/5	23/2	17/6	26/3
18/1	26/10	18/2	26/11	18/3	25/12	18/4	25/1	18/5	24/2	18/6	27/3
19/1	27/10	19/2	27/11	19/3	26/12	19/4	26/1	19/5	25/2	19/6	28/3
20/1	28/10	20/2	28/11	20/3	27/12	20/4	27/1	20/5	26/2	20/6	29/3
21/1	29/10	21/2	29/11	21/3	28/12	21/4	28/1	21/5	27/2	21/6	30/3
22/1	30/10	22/2	30/11	22/3	29/12	22/4	29/1	22/5	28/2	22/6	31/3
23/1	31/10	23/2	31/11	23/3	30/12	23/4	30/1	23/5	1/3	23/6	1/4
24/1	1/11	24/2	1/12	24/3	31/12	24/4	31/1	24/5	2/3	24/6	2/4
25/1	2/11	25/2	2/12	25/3	1/1	25/4	1/2	25/5	3/3	25/6	3/4
26/1	3/11	26/2	3/12	26/3	2/1	26/4	2/2	26/5	4/3	26/6	4/4
27/1	4/11	27/2	4/12	27/3	3/1	27/4	3/2	27/5	5/3	27/6	5/4
28/1	5/11	28/2	5/12	28/3	4/1	28/4	4/2	28/5	6/3	28/6	6/4
29/1	6/11	29/2	6/12	29/3	5/1	29/4	5/2	29/5	7/3	29/6	7/4
30/1	7/11	30/2	7/12	30/3	6/1	30/4	6/2	30/5	8/3	30/6	8/4
31/1	8/11	31/2	8/12	31/3	7/1	31/4	7/2	31/5	9/3		
1/7	9/4	1/8	10/5	1/9	10/6	1/10	10/7	1/11	10/8	1/12	9/9
2/7	10/4	2/8	11/5	2/9	11/6	2/10	11/7	2/11	11/8	2/12	10/9
3/7	11/4	3/8	12/5	3/9	12/6	3/10	12/7	3/11	12/8	3/12	11/9
4/7	12/4	4/8	13/5	4/9	13/6	4/10	13/7	4/11	13/8	4/12	12/9
5/7	13/4	5/8	14/5	5/9	14/6	5/10	14/7	5/11	14/8	5/12	13/9
6/7	14/4	6/8	15/5	6/9	15/6	6/10	15/7	6/11	15/8	6/12	14/9
7/7	15/4	7/8	16/5	7/9	16/6	7/10	16/7	7/11	16/8	7/12	15/9
8/7	16/4	8/8	17/5	8/9	17/6	8/10	17/7	8/11	17/8	8/12	16/9
9/7	17/4	9/8	18/5	9/9	18/6	9/10	18/7	9/11	18/8	9/12	17/9
10/7	18/4	10/8	19/5	10/9	19/6	10/10	19/7	10/11	19/8	10/12	18/9
11/7	19/4	11/8	20/5	11/9	20/6	11/10	20/7	11/11	20/8	11/12	19/9
12/7	20/4	12/8	21/5	12/9	21/6	12/10	21/7	12/11	21/8	12/12	20/9
13/7	21/4	13/8	22/5	13/9	22/6	13/10	22/7	13/11	22/8	13/12	21/9
14/7	22/4	14/8	23/5	14/9	23/6	14/10	23/7	14/11	23/8	14/12	22/9
15/7	23/4	15/8	24/5	15/9	24/6	15/10	24/7	15/11	24/8	15/12	23/9
16/7	24/4	16/8	25/5	16/9	25/6	16/10	25/7	16/11	25/8	16/12	24/9
17/7	25/4	17/8	26/5	17/9	26/6	17/10	26/7	17/11	26/8	17/12	25/9
18/7	26/4	18/8	27/5	18/9	27/6	18/10	27/7	18/11	27/8	18/12	26/9
19/7	27/4	19/8	28/5	19/9	28/6	19/10	28/7	19/11	28/8	19/12	27/9
20/7	28/4	20/8	29/5	20/9	29/6	20/10	29/7	20/11	29/8	20/12	28/9
21/7	29/4	21/8	30/5	21/9	30/6	21/10	30/7	21/11	30/8	21/12	29/9
22/7	30/4	22/8	31/5	22/9	1/7	21/10	30/7	22/11	31/8	22/12	30/9
23/7	1/5	23/8	1/6	23/9	2/7	22/10	31/7	23/11	1/9	23/12	31/9
24/7	2/5	24/8	2/6	24/9	3/7	23/10	1/8	24/11	2/9	24/12	1/10
25/7	3/5	25/8	3/6	25/9	4/7	24/10	2/8	25/11	3/9	25/12	2/10
26/7	4/5	26/8	4/6	26/9	5/7	25/10	3/8	26/11	4/9	26/12	3/10
27/7	5/5	27/8	5/6	27/9	6/7	26/10	4/8	27/11	5/9	27/12	4/10
28/7	6/5	28/8	6/6	28/9	7/7	27/10	5/8	28/11	6/9	28/12	5/10
29/7	7/5	29/8	7/6	29/9	8/7	28/10	6/8	29/11	7/9	29/12	6/10
30/7	8/5	30/8	8/6	30/9	9/7	29/10	7/8	30/11	8/9	30/12	7/10
31/7	9/5	31/8	9/6			30/10	8/8			31/12	8/10
						31/10	9/8				9/10

Legendas:
 DC - Data de cobertura/inseminação do animal;
 PP - Data prevista para o parto;

Produtos de alta tecnologia e qualidade.

Av. Joaquim F. Silva, 1201
 Nsa. Sra. de Fátima | Monte Carmelo | MG

(34) 3842.2067 | (34) 3842.0034

 (34) 9 8834-3621

 industria@retirodaroca.com



RETIRO DA ROÇA

Sempre ao lado do produtor Rural.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Linha de nutrição para gado de leite



Na formulação de ração para bovinos, o uso de alimentos concentrados tem como principal objetivo suprimir as deficiências nutricionais das forrageiras. Para isso, as características da matéria-prima da ração são de suma importância. Por este motivo, desenvolvemos formulações personalizadas, com um criterioso padrão de seleção de matérias-primas, para o melhor desempenho de rebanhos leiteiros.

COMO ESCOLHER A RAÇÃO

O primeiro passo para escolha de uma ração, é analisar a categoria animal e qual a fonte de volumoso que esses animais irão ingerir.


A ração é uma fonte concentrada, que complementará as exigências que a planta (pasto ou silagem) não conseguem fornecer aos animais.

PRINCIPAIS LINHAS LACTAÇÃO - RRR

- Puro Leite - A linha PURO LEITE é uma linha nobre, formulada com milho, soja, núcleo mineral e tamponante.
- Top Leite - A linha TOP LEITE é formada de ingredientes para adaptação em diferentes sistemas de produção, contém fonte de NNP (Nitrogênio Não Proteico) para otimização da produção.
- Alta Energia (AE) - A linha AE tem rações com ótimo custo/benefício, contendo em sua formulação fontes diversas de energia e proteína, equilibradas para o rebanho leiteiro.

*Todas as linhas possuem aditivo promotor de crescimento e eficiência alimentar.

LACTAÇÃO X PRODUÇÃO



CRIA

- > Puro Leite Bezerra 20%;
- > AE Bezerra 20%;

RECRIA

- > Puro Leite Novilha 18%;
- > Top Leite Novilha 18%;
- > AE Novilha 18%;

LACTAÇÃO

- > Puro Leite L (20%, 22% e 24%);
- > Top Leite L (20%, 22%, 24% e 27%);
- > AE Lactação (20%, 22% e 24%);

PRÉ-PARTO

- > Puro Leite Pré-Parto;
- > Top Leite Pré-Parto;

CATEGORIA	FASE	ALIMENTAÇÃO	RAÇÕES	MODO DE USO	OBJETIVO
Cria	Bezerras (até desmame)	A base alimentar de bezerras recém-nascidos é o leite, sendo que o colostro (primeiro leite produzido pela vaca) é de extrema importância para o desenvolvimento imunológico dessa categoria. Desta forma, é importante que este alimento seja fornecido na proporção de 10 a 12% do seu peso vivo, junto com o leite, é importante estimular o desenvolvimento ruminal dos bezerras, órgão antes sem função devido a base alimentar ser o leite. Logo deve-se fornecer alimentos sólidos como ração, que vai auxiliar o crescimento e desenvolvimento ruminal do bezerro tornando ele um animal ruminante.	<ul style="list-style-type: none"> • Puro Leite bezerra 20% • AE Bezerra 20% 	Livre consumo	Desmamar bezerras em até 3 meses, com os requisitos: estar consumindo entre 800g a 1.000g de ração ao dia e pesar 100 kg.
Recria	Desmama até o parto	A fase de recria é uma das etapas determinantes para o sucesso da atividade, porque a taxa de crescimento e ganho de peso afetarão diretamente a puberdade, idade de cobertura, idade ao primeiro parto e consequentemente a lactação. A idade em que novilhas têm seu primeiro cio ou alcançam a puberdade está fortemente relacionada com seu peso vivo. Assim, o atraso no início da puberdade, resultará em atraso na idade ao primeiro parto, aumentando o custo final da novilha. No parto, estas fêmeas devem estar em boa condição corporal, sendo o escore ideal de 3,75 (numa escala de 1 a 5). Assim o uso de dietas balanceadas e de suplementos minerais específicos nesta fase é de fundamental importância para o sucesso na atividade leiteira.	<ul style="list-style-type: none"> • Puro Leite Novilha 18% • Top Leite Novilha 18% • AE Novilha 18% 	Fornecer de 0,6% a 0,8% do peso vivo do animal	O ganho de peso diário da novilha deve ser acima de 0,6 kg por dia durante o 3º até 15º meses de idade. A cobertura começa entre os 14 e 15 meses de idade, com 70% do peso corporal adulto, para parirem aos 23 ou 24 meses com peso adequado.
Lactação	Do parto até a secagem	Durante a lactação os animais vão exigir nutrientes para a produção de leite, manutenção, crescimento e para gestação. Deficiências nutricionais durante o início da lactação resulta em período de serviço mais longo, ou seja, a fêmea demora mais dias para engravidar, aumentando o intervalo entre partos. Já no terço médio de lactação, os nutrientes ingeridos servem para recompor as reservas orgânicas, manter a produção de leite com qualidade e também para a nutrição fetal. No terço final da lactação e da gestação, a suplementação nutricional proporciona adequado crescimento fetal (fase de maior crescimento durante toda a gestação), preparação da glândula mamária para a próxima lactação e reservas para a formação de colostro e também para o correto funcionamento do sistema reprodutivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Puro Leite Lactação (20%, 22% e 24%) • Top Leite Lactação (20%, 22%, 24% e 27%) • AE Lactação (20%, 22% e 24%) 	Fornecer 1kg de ração para cada 3kg de leite produzido	Fornecer nutrientes para ter o potencial máximo em produção de Leite, e que possibilite o animal a voltar a atividade reprodutiva mais rápido.
Pré-Parto	30 dias antes do parto	Os animais em Lactação devem ser "secos" (ter a lactação interrompida) 60 dias antes da data prevista para o parto. Sendo que, 30 dias antes do parto, inicia-se a fase Pré-Parto. A dieta deverá ser ajustada para esta fase, com o objetivo de fornecer os minerais em quantidades adequadas para repor as reservas utilizadas durante a lactação e também da gestação, formação de colostro e nutrição do feto.	<ul style="list-style-type: none"> • Puro Leite Pré-Parto • Top Leite Pré-Parto 20% 	Fornecer de 2-4kg por animal/dia	Prevenir a incidência de mastites, metrites, retenção de placenta e hipocalcemia puerperal (febrea do leite).

Obs.: Consulte orientações de um profissional habilitado.